



颈椎病，发病越来越年轻化

上个世纪80年代颈椎病的发病高峰年龄是55岁，90年代是49岁，而目前颈椎病高发年龄已提前到了39岁，呈现出越来越年轻化的趋势。

随着社会的进步，工作方式的改变，特别是工作节奏的加快，依赖电脑者由于长期低头伏案工作，长时间保持单一姿势，肌肉韧带疲劳，从而加速了颈、腰椎疾病的发生。颈椎长时间处于屈曲位或某些特定体位，不仅使颈椎间盘内的压力增高，而且也使颈部肌肉长期处于非协调受力状态，颈后部肌肉和韧带易受牵拉劳

损，再加上扭转、侧屈过度，更进一步导致损伤，易发生颈椎病。

正确认识

1.颈型颈椎病：颈椎病最早期表现以颈部症状为主，故又称局部型颈椎病或颈型颈椎病。表现为颈部疼痛、酸胀不适，常在清晨或起床时发觉颈部不适，部分病人颈部活动受限或强迫体位，个别病人上肢可有短暂的感觉异常。急性发作时常被俗称“落枕”。此型实际上是各型颈椎病的最初阶段，也是治疗的最有利时机。治疗以非手术疗法为主，经保守治疗大多数病人可以治愈。

2.神经根型颈椎病：此型最多见，约占50%~60%。由于颈椎退变，致压迫物压迫脊神经根或被动牵拉产生神经根症状。表现为与受累神经一致的神经干性痛或神经丛性痛，肌力减弱，肌肉萎缩，病人表现颈肩痛，前臂桡侧痛，手的桡侧3指痛。

3.脊髓型颈椎病：约占颈椎病的10%~15%。由于颈椎退变结构压迫脊髓，所以此型症状最严重。表现为上肢或下肢麻木无力，精细动作笨拙，后期出现尿频或排尿、排便困难等大小便功能障碍。脊髓型颈椎病，由于疾病自然史将逐渐发展使症状加重，故确诊后应及时手术治疗。脊髓损伤较重且时间长者，手术疗效差。

积极预防

坐姿正确：预防颈椎病最重要的是坐姿正确。在坐姿上应保持自然的端坐位，颈肩部放松，保持最舒适自然的姿势，臀部和背部要充分接触椅面，双肩后展，两肩连线与桌缘平行，脊柱正直，两足着地。将桌椅高度调到与自己身高比例合适的最佳状态，使目光平视电脑屏幕，双肩放松。避免头颈部过度前屈或过度后仰，以减轻长时间端坐引起的颈部疲劳。

抬头望远：每当伏案过久，应抬头向远方眺望半分钟左右。这样既可消除疲劳感，又有利于颈椎的保健。

睡眠方式：枕头中央应略凹



进。枕头不可以过高、过硬或过低，枕头高低以生理位为佳，一般高度以8cm~15cm为宜。习惯侧卧者，应使枕头与肩同高。颈部应充分接触枕头并保持略后仰，不要悬空、不要躺着看书、不要对着头颈部吹冷风。

避免损伤：避免和减少急性颈椎损伤，如避免猛抬重物、紧急刹车等。

防寒防湿：避免午夜、凌晨洗澡时受风寒侵袭。颈椎病患者常与风寒、潮湿等季节气候变化有密切关系。风寒使局部血管收缩，血流速度降低，有碍组织的代谢和血液循环。

预防感染：积极治疗颈部感染和其他颈部疾病。

自我保健

在早期未出现脊髓和神经的不可逆性损害以前，适当进行康复锻炼可改善患者颈部的血液循环，松解粘连和痉挛的软组织，但颈椎病的急性发作期宜制动保护。

锻炼姿势为两脚分开与肩同宽，两臂自然下垂，全身放松，两眼平视，均匀呼吸，站坐均可。具体动作为：

左顾右盼：头先向左后向右转动，幅度宜大，自觉酸胀为好，30次。

前后点头：头先前再后，前俯时

颈项尽量前伸拉长，30次。

旋肩舒颈：双手置两侧肩部，掌心向下，两臂先由后向前旋转20~30次，再由前向后旋转20~30次。

摇头晃脑：头向左一前一右一后旋转5次，再反方向旋转5次。

头手相抗：双手交叉紧贴后颈部，用力顶头颈，头颈则向后用力，互相抵抗5次。

双手托天：双手上举过头，掌心向上，仰视手背5秒钟。

运动时一定要注意：动作尽可能慢，颈部肌肉一定要放松，排除杂念，锻炼持之以恒。

手术治疗

颈椎病大多数可以通过保健的方式来缓解症状，但如脊髓型颈椎病脊髓受压明显、神经根型颈椎病神经受压明确等，应该接受手术治疗。手术前一定要在正规大医院进行确诊，术前诊断包括X片、核磁共振、椎动脉造影等。当然由于



颈椎病治疗损伤颈脊髓的风险较大，也应该在正规大医院接受治疗，以免发生意外。(新民)

博爱孕育讲堂

主办：
周口晚报
周口市医疗救助基金会
周口博爱妇科医院

不孕不育就医指导

世界卫生组织规定，婚后同居未避孕，性生活正常，一年不孕者为不孕，需到医院检查不孕的原因。

导致女性不孕不育的常见因素有以下几种：

1.阴道疾病

因霉菌、滴虫、淋球菌、支原体、衣原体等感染造成细菌性阴道炎、霉菌性阴道炎，改变了阴道生化环境，降低精子活力和生存能力，从而影响受孕。

2.宫颈疾病

宫颈管先天性异常、闭锁或狭窄、息肉、宫颈糜烂、肿瘤、粘连等均可影响精子通过；宫颈粘液中存在抗精子抗体，不利于精子穿透宫颈管或完全使精子失去活动能力。

3.输卵管因素

输卵管过长或狭窄，输卵管炎症引起管腔闭塞、积水或粘连，均会妨碍精子、卵子或受精卵的运行。输卵管疾病可占女性不孕的25%，是不孕的重要原因。

4.卵巢因素

卵巢发育不全、黄体功能不全、卵巢早衰、多囊卵巢综合征、卵巢囊肿等影响卵泡发育或卵子排出的因素，都会造成不孕。

5.内分泌失调因素

下丘脑-垂体-卵巢轴三者之间的调节不完善，表现为无排卵月经，闭经或黄体功能失调，这些都是不孕症的可能原因。

导致不孕不育的原因较为复杂，要明确诊断，必须做一系列的检查，而且这些检查需要选择一定的时间，有时还需夫妻同做。因此，女性首次来医院检查应选择在月经干净后3~7天，最好丈夫同做精液化验。值得注意的是，取精液检查需要禁欲3~5天，所以来检查前的这几天夫妻不要同房。如抽血检查性激素应在月经来潮的第3天，或者规定的其他时间。做输卵管造影和宫腹腔镜检查应在月经干净后3~7天，监测排卵应在月经8~10天后。

周口博爱妇科医院为不孕不育患者提供“一站式”服务，各种先进仪器的引进、COOK导丝助孕技术的开展，给许多不孕症患者送去了佳音。

周口市医疗救助基金会 博爱妇科 微创妇科专家

袁文杰

不孕不育科主任，中华医学协会会员，擅长宫腔镜技术，周口地区著名不孕不育专家之一，曾多次在北京妇产科医院、河南省妇幼保健院妇科进修深造宫腔镜技术。临床经验丰富，长期致力于男女不孕不育疾病的诊疗与研究，特别是利用宫腔镜技术对宫腔内疾病的诊断与治疗有很高造诣，先后在省级刊物上发表论文数十篇。

预告：本周五(4月30日)，“孕育讲堂”将推出《造成男性不育的原因有哪些》，敬请关注！

周口博爱妇科医院 招聘
健康热线：0394-8366555 03:13310114
地址：周口市黄河路（乘车路线：中源热力下车后走3、4路车到普济路口下车往东走100米；1、7、10、13路车到南门口下车即到）
新农合定点医院

纠正行业不正之风 人人有责

- 骗取新农合资金
- 医疗乱收费
- 无证行医
- 医疗服务粗暴
- 雇用医托
- 医院出租承包科室……

发现以上情况，请及时拨打我们有奖新闻热线！本报将派记者实地采访、落实情况，并为举报者保密。

新闻热线
13592220126 13592220031
13033905685 13526297566

博士眼镜双店同庆酬宾活动

◆2010新款暴龙太阳镜炫装上市，全场8折，200

余款供您选择，先到先得！

◆购女款彩色渐进偏光镜，送天堂伞一把(数量有限)；

◆谢霆锋代言、博士眼镜独家代理“风火轮”品牌

全系隆重上市，太阳镜系列全场7.5折，买“风火轮”镜架送“风火轮”镜片。

选择博士，就是选择超值！

一店：周口市五一路与七一路交叉口 电话：0394—8382888

二店：周口市五一广场对面 电话：0394—8289555

